


学生番号

氏名

問題1. 有機質, 無機質, 水の割合を図に示す.



▨ : 有機質, ■ : 無機質, □ : 水

1 組成に最も近いものは上図のどれか? 空欄に記号 (ア~オ) を記せ. 重複選択可.

骨:

軟骨:

象牙質:

エナメル質:

セメント質:

2 エナメル質と象牙質の無機質について

①ヒドロキシアパタイトと不定形リン酸カルシウムの比率を比較せよ.

②ヒドロキシアパタイト結晶の大きさを比較せよ.

3 カッコを埋めよ.

ヒドロキシアパタイトの単位胞はカルシウムイオン () 個, リン酸イオン () 個, ヒドロキシイオン () 個から構成され, 純粋なヒドロキシアパタイトの Ca/P 比 (モル比) は () である.

問題 2. 空欄に適切な語句または文を記入せよ (日本語, 英語または元素記号). あるいはカッコの中で最も適切な語句を選んで丸で囲みなさい.

ミネラルとは生体を構成するすべての元素から (①) (②) (③) (④) の 4 元素を除いたものである.

生体中で最も多く含まれるミネラルは (⑤)

2 番目に多く含まれるミネラルは (⑥)

システイン, メチオニンを構成するミネラルは (⑦)

人体に最も多く存在する陰イオンであり, 胃酸の主成分である陰イオンは (⑧)

60%が骨に, 30%が筋に存在しているミネラルは (⑨)

ヒドロキシアパタイトの結晶性を向上させるミネラルは (10)

甲状腺ホルモン (T_3 , T_4) はアミノ酸 (11) 残基にミネラル (12) が付加したものの。

ビタミン B_{12} を構成するミネラルは (13)

鉄イオンは小腸で吸収され、(14) が血漿中を運び、フェリチンが細胞内に貯蔵する。

DNA を構成するミネラルは (15)

亜鉛の機能は (16)

ナトリウムポンプ (ナトリウム/カリウムポンプ, Na^+ , K^+ -ATPase) は細胞内の (17) を細胞外へ、細胞外の (18) を細胞内に輸送する。

カルシウムイオンの細胞内濃度は細胞外濃度に比べると、(19) (低い ほとんど同じである 高い)。

ビタミン B_1 を摂取すると肝でリン酸 2 分子と結合して (20) となり、補酵素として糖代謝にはたらく。ビタミン B_1 欠乏症 (21) の予防、治療因子として発見された。

フィロキノン、メナキノンと呼ばれるビタミン (22) は血液凝固因子前駆体のアミノ酸

(23) 残基をカルボキシ化する反応に必要である。このビタミンと類似した構造をもつ血液凝固阻薬は (24)。同様の反応が骨基質タンパク質 (25) でみられる。

脂溶性ビタミン: (26) (27) (28) (29)

β -カロテンから生じるビタミンは (30)

補酵素としてはたらく脂溶性ビタミンは (31)

ビタミン (32) はコラーゲン前駆体のプロリン残基とリシン残基の水酸化反応の補酵素であり、このビタミンが不足すると正常なコラーゲンが生成しないために (33) 病になる。

補酵素が FAD であるビタミンは (34)

補酵素が NADH であるビタミンは (35) で、ニコチン酸とニコチン酸アミドの総称である。

パントテン酸は補酵素 (36) の成分である。

ビタミン D_3 は体内で 7-デヒドロコレステロールから (37) (皮膚, 肝臓, 腎臓) で開環して合成される。その後、水酸化され活性型ビタミン D_3 となる。欠乏すると骨の石灰化不全を引き起こし、欠乏症を小児では (38)、大人では (39) という。

補酵素のピリドキサルリン酸はビタミン (40) に由来し、アミノ酸代謝に関わる。

夜盲症はビタミン (41) の欠乏により起こる。網膜で、このビタミンとオプシンが結合した (42) は、光を感知して構造変化し、G タンパク質を活性化し、神経伝達を引き起す。

(43) (レチノール レチナール レチノイン酸) は核受容体と結合して転写因子としてはたらく。

巨赤芽球性貧血は (44) あるいは (45) のビタミン欠乏などによる DNA 合成障害が原因で発症する。

α -トコフェロールはビタミン (46) の一種であり、抗酸化作用を示す。